

Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2018




Mayo 2019

CONTENIDO

- 1. Aspectos Metodológicos**
- 2. Fecundidad**
- 3. Salud Materna**
- 4. Salud Infantil**
- 5. Factores de Riesgo en la Salud**
- 6. Enfermedades No Transmisibles**
- 7. Violencia Familiar**

ASPECTOS METODOLÓGICOS



OBJETIVO: Proveen información actualizada sobre la dinámica demográfica, el estado de salud de las madres y niños menores de cinco años, así como brindar información sobre el estado y factores asociados a las enfermedades no transmisibles y transmisibles.

1 POBLACIÓN BAJO ESTUDIO

-  Hogares particulares y sus miembros residentes habituales.
-  Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años: **34 mil 971**
-  Niñas y niños menores de 5 años : **23 mil 983**
-  Niñas y niños menores de 12 años de edad (salud ocular, bucal y mental): **45 mil 487**
-  Personas de 15 y más años de edad (enfermedades no transmisibles y transmisibles, prevención y control del cáncer): **34 mil 291**
-  Personas de 50 y más años de edad (salud ocular): **8 mil 498**
-  Personas de 60 y más años (salud bucal): **4 mil 873**

2 MARCO MUESTRAL

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, la actualización SISFOH 2012-2013 y la actualización del material cartográfico de la ENDES.

3 TIPO DE MUESTRA

Bietápica, probabilística e independiente, a nivel regional, por área urbana y rural.

4 COBERTURA

- ✓ **Geográfica:** Nivel nacional, área urbana y rural, los 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao.
- ✓ **Temporal:** Febrero a diciembre 2018

6 TAMAÑO DE MUESTRA

Conglomerados	3 254
Viviendas	36 760

7 TASA DE RESPUESTA

La tasa de respuesta en el año 2018 fue **97,6**.

8 NIVEL DE REPRESENTATIVIDAD

- ✓ Nacional
- ✓ Área de residencia: Urbana y Rural
- ✓ Región natural: Lima Metropolitana, Resto Costa, Sierra y Selva
- ✓ Departamentos


9 TIPO DE CUESTIONARIO

El registro de respuestas se hizo a través de dispositivos móviles (Tablet)

- ✓ Cuestionario del hogar (Jefe/a del hogar o persona de 18 y más años de edad)
- ✓ Cuestionario Individual (Mujeres de 12 a 49 años de edad)
- ✓ Cuestionario de Salud (Personas de 15 años y más de edad)


1. FECUNDIDAD

- ☐ *Edad mediana a la primera relación sexual*
- ☐ *Edad mediana a la primera unión conyugal*
- ☐ *Uso de métodos de planificación familiar*
- ☐ *Tasa global de fecundidad*
- ☐ *Embarazo adolescente*



PERÚ: EDAD MEDIANA A LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL EN MUJERES DE 25 A 49 AÑOS DE EDAD, 2009 - 2018

(Edad en años)



PERÚ: EDAD MEDIANA A LA PRIMERA UNIÓN CONYUGAL EN MUJERES DE 25 A 49 AÑOS DE EDAD, 2009 - 2018


(Edad en años)

Quinquenio 2018/2013

-0,5 año

Año: 2018/2017

-0,1 año




PERÚ: EDAD MEDIANA A LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL Y PRIMERA UNIÓN CONYUGAL EN MUJERES DE 25 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2018

(Edad en años)

PRIMERA RELACIÓN SEXUAL




PRIMERA UNIÓN CONYUGAL



1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualar Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.

PERÚ: USO ACTUAL DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD ACTUALMENTE UNIDAS, 2009 - 2018

(Porcentaje)




1/Comprende Otros: Implantes, Esterilización masculina, métodos vaginales y MELA.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.

PERÚ: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 1/, 2009 - 2018

(Promedio de hijos por mujer)




1/ Tasas para los tres años que precedieron la encuesta. La tasa global de fecundidad esta expresada en nacimientos por mujer.
La estimación del indicador corresponde a las encuestas del 2017 y 2018.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.

PERÚ: ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD ALGUNA VEZ EMBARAZADAS, 2009 – 2018

(Porcentaje)




Nota: Incluye las que ya son madres y las embarazadas por primera vez.
La estimación del indicador corresponde a las encuestas del 2017 y 2018.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.

2. SALUD MATERNA

- ☐ *Atención prenatal*
- ☐ *Atención del parto*
- ☐ *Parto por cesárea.*



PERÚ: GESTANTES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON 6 Y MÁS CONTROLES PRENATALES, 2009 - 2018



Nota: Último nacimiento en los 5 años anteriores de la encuesta.


* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.


PERÚ: PARTO INSTITUCIONAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, 2009 - 2018



* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.

PERÚ: PARTOS POR CESÁREA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, 2009 - 2018




* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.

PERÚ: PARTOS POR CESÁREA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2018



(Porcentaje)



1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualar Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.



3. SALUD INFANTIL

- ☐ *Desnutrición crónica infantil*
- ☐ *Sobrepeso y obesidad infantil*
- ☐ *Anemia*
- ☐ *Suplemento de hierro*
- ☐ *Inmunizaciones*
- ☐ *Infección Respiratoria Aguda (IRA)*
- ☐ *Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)*



PERÚ: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA (PATRÓN OMS) EN MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD, 2007 - 2018

(Porcentaje)






* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

1/Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.


PERÚ: SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, 2009 - 2018



* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.010$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.

PERÚ: PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD, 2005 - 2018



* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).




1/Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.

PERÚ: PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD, 2005 - 2018

(Porcentaje)




Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.

PERÚ: PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD, 2016-2018

(Porcentaje)


Grupo de edad en meses, 2018

Edad en meses




Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO, 2009 - 2018



Formas de presentación del Suplemento de hierro, 2018




Nota: Se indaga el consumo de suplemento de hierro en los últimos 7 días anteriores a la entrevista.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

1/ Comprende hierro en gomitas, jarabe multivitamínico que contiene hierro, entre otros.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2018



Nota: Se indaga el consumo de suplemento de hierro en los últimos 7 días anteriores a la entrevista.
1/Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
2/Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD, 2009 - 2018



Nota: Vacunas básicas completas incluye 1 dosis de BCG, 3 dosis de Pentavalente y 3 Dosis contra la Poliomielitis.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.

PERÚ: MENORES DE 12 MESES DE EDAD CON VACUNAS CONTRA NEUMOCOCO, 2009 - 2018



(Porcentaje)

Quinquenio 2018/2013


6,0 p.p. (***)

Año: 2018/2017


-1,0 p.p.



Quintil de riqueza, 2018



Región natural, 2018




Nota: Incluye 2 dosis de Neumococo.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.010$).


1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional de Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.


PERÚ: MENORES DE 12 MESES DE EDAD CON VACUNAS CONTRA ROTAVIRUS, 2009 - 2018



Quintil de riqueza, 2018



Región natural, 2018





Nota: Incluye 2 dosis de Rotavirus.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.010$).

1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional de Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.

PERÚ: INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD, 2009 - 2018



Nota: IRA, tos acompañada con respiración rápida, agitada; dificultad para respirar por problema de pecho o nariz.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).



1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.

PERÚ: ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) EN MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD, 2009 - 2018

(Porcentaje)



* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).


1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.


4. FACTORES DE RIESGO EN LA SALUD

- ☐ *Sobrepeso*
- ☐ *Obesidad*
- ☐ *Bajo consumo de frutas y verduras*
- ☐ *Riesgo cardiovascular según perímetro abdominal.*




PERÚ: SOBREPESO EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 2014 – 2018

Variación acumulada 2014-2018



2014 2015 2016 2017 2018




Diferencia en puntos porcentuales



(Porcentaje)



En porcentaje



Nota: Se ha considerado el cálculo del sobrepeso en: adolescentes (15 a 17 años) mayor a una desviación estándar del Índice de Masa Corporal para la edad, adultos (18 a 59 años) $\geq 25\text{kg/m}^2$, adulto mayor (60 y más años) $\geq 28\text{kg/m}^2$. Excluye a mujeres gestantes.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.010$).

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.


2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.


PERÚ: OBESIDAD EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 2014 - 2018

(Porcentaje)

Variación acumulada 2014-2018




Diferencia en puntos porcentuales




Sexo:

26,0% 19,3%



Área de residencia



Nivel de educación, 2018





Nota: Se ha considerado el cálculo de la obesidad en: adolescentes (15 a 17 años), mayor a dos desviaciones estándar del Índice de Masa Corporal para la edad, adultos (18 a 59 años) $\geq 30\text{kg/m}^2$, adulto mayor (60 y más años) $\geq 32\text{kg/m}^2$. Excluye a mujeres gestantes.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.010$).


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.

PERÚ: CONSUMO DE CINCO PORCIONES DE FRUTA Y/O ENSALADA DE VERDURAS AL DÍA DE LAS PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 2014 - 2018


(Porcentaje)



Sexo, 2018



Área de residencia, 2018




* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.010$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.

PERÚ: RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN PERÍMETRO ABDOMINAL EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 2018

Nacional



(Porcentaje)



Sexo



18,4



Riesgo bajo

55,1



21,2



Riesgo alto

23,6



60,4



Riesgo muy alto

21,4



Área de residencia

Urbana

Rural

Riesgo bajo

32,7

51,4

Riesgo alto

22,8

20,4

Riesgo muy alto

44,4

28,2

Quintil de riqueza

Inferior



25,9

Segundo



39,4

Intermedio



44,0

Cuarto



45,5

Superior



50,7

Edad

15-19



8,8

20-29



28,1

30-59



49,9

60 y más




52,7

Nota: Se excluye a las personas postradas, las mujeres gestantes, mujeres post parto, personas con incapacidad física que impida la medición. Clasificación según guía para la valoración nutricional antropométrica dado por el CENAN.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.


5. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

- ☐ *Hipertensión arterial*
- ☐ *Diabetes mellitus*
- ☐ *Prevención y control del cáncer.*




PERÚ: PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 2014 - 2018




Variación acumulada 2014-2018



Diferencia en puntos porcentuales



(Porcentaje)



Nota: La prevalencia se estimó en base a los que tenían diagnóstico por profesional de salud y los reportados en campo.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.010$).





1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.

PERÚ: DIABETES MELLITUS DIAGNOSTICADA POR PROFESIONAL DE SALUD EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 2014 - 2018

(Porcentaje)





* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.010$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.

PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE PAPANICOLAOU EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS, 2014 - 2018

(Porcentaje)



* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.010$).


1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.


PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON EXAMEN CLÍNICO DE MAMA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 2014 - 2018

(Porcentaje)


Variación acumulada 2014-2018




Diferencia en puntos porcentuales



Grupo de edad, 2018



Nivel de educación, 2018




* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.010$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.


6. VIOLENCIA FAMILIAR

- ❑ *Violencia contra la mujer en los últimos 12 meses*
- ❑ *Personas que corrigen a las niñas y niños de 1 a 5 años de edad y principales formas que utilizan de corrección.*




PERÚ: VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA LA MUJER DE 15 A 49 AÑOS, EJERCIDA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR EL ESPOSO O COMPAÑERO, 2018

(Porcentaje)




VIOLENCIA TOTAL

Quintil de riqueza



Nivel de educación




* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.010$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.


PERÚ: PERSONAS QUE CORRIGEN A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD Y PRINCIPALES FORMAS QUE UTILIZAN EL PADRE Y LA MADRE CUANDO LAS/LOS CORRIGEN, 2018

(Porcentaje)

Personas que corrigen a las niñas y niños de 1 a 5 años de edad en el hogar



Principales formas que utilizan el padre y la madre para corregir a sus hijas/os



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.



@INEI_oficial

www.inei.gob.pe
infoinei@inei.gob.pe



INEIpaginaOficial